

Инструкция по изготовлению нейтрализующих веществ

От хлора 2% раствор соды:

На 1 литр воды – 20 гр. Соды (2 чайные ложки);

На 12 литров воды – 240 гр.;

На 25 литров воды – 500 гр.

От аммиака – 5% раствор лимонной кислоты:

На 1 литр воды – 50 гр. лимонной кислоты (2 столовые ложки);

На 12 литров воды – 500 гр. лимонной кислоты;

На 25 литров воды – 1250 гр. лимонной кислоты.

От радиации – Йодная профилактика:

Йодистый калий следует принимать после еды вместе с чаем, киселём или водой 1 раз в день в течение 7 суток:

- детям до 2 лет – по 0,04 гр. за один приём (1/4 табл.),

- детям старше 2 лет и взрослым – по 0,125 гр. за один приём (одна таблетка).

Водно-спиртовой раствор йода нужно принимать после еды 3 раза в день в течение 7 суток:

- детям до 2 лет – по 1 – 2 капли 5% настойки на 100 мл. молока,

- детям старше 2 лет и взрослым – по 3 – 5 капель на стакан молока или воды.


Наносить на поверхность рук тампоном настойку йода в виде сетки 1 раз в день в течение 7 суток.

Изготовление ватно-марлевой повязки:

ВМП – является простейшим средством защиты органов дыхания.

Её изготавливают из куска марли размером 80х40 (100х60) см.

90 – 100 см.



Марлю расстилают на столе и на середину кладут ровный слой ваты размером 20х15 см. (30-20), толщиной 1-2 см. с обеих сторон марлю загибают по всей длине, накладывая на вату. Оставшиеся по длине марли концы разрезают на 25-30 (30-35) см. с каждой стороны для завязывания. Надетая повязка должна закрывать подбородок, рот, нос до глаз. Концы повязки завязывают: нижние на темени, верхние – на затылке. Образующиеся неплотности между повязкой, крыльями носа и щеками, заложить ватой.

Инструкция
по приготовлению 5 % раствора
ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
при выбросе АММИАКА

1. Высыпать в ведро 150 гр. лимонной кислоты.
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 2 % раствора
СОДЫ
при выбросе ХЛОРА

1. Высыпать в ведро 60 гр. соды
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 5 % раствора
ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
при выбросе АММИАКА

1. Высыпать в ведро 150 гр. лимонной кислоты.
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 2 % раствора
СОДЫ
при выбросе ХЛОРА

1. Высыпать в ведро 60 гр. соды
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 5 % раствора
ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
при выбросе АММИАКА

1. Высыпать в ведро 150 гр. лимонной кислоты.
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 2 % раствора
СОДЫ
при выбросе ХЛОРА

1. Высыпать в ведро 60 гр. соды
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 5 % раствора
ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
при выбросе АММИАКА

1. Высыпать в ведро 150 гр. лимонной кислоты.
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать.
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 2 % раствора
СОДЫ
при выбросе ХЛОРА

1. Высыпать в ведро 60 гр. соды
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 5 % раствора
ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
при выбросе АММИАКА

1. Высыпать в ведро 150 гр. лимонной кислоты.
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать.
3. Смочить ватно-марлевую повязку.

Инструкция
по приготовлению 2 % раствора
СОДЫ
при выбросе ХЛОРА

1. Высыпать в ведро 60 гр. соды
2. Добавить 3 литра воды, хорошо размешать
3. Смочить ватно-марлевую повязку.